

表 1421 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	69	177	343	415	176	36	10	1,226	86	1,312	5.51	2.38
(%)	(5.6)	(14.4)	(28.0)	(33.8)	(14.4)	(2.9)	(0.8)	(100.0)				
1年~	63	101	267	407	235	54	32	1,159	48	1,207	6.17	2.67
(%)	(5.4)	(8.7)	(23.0)	(35.1)	(20.3)	(4.7)	(2.8)	(100.0)				
2年~	47	90	273	521	356	113	58	1,458	60	1,518	6.81	2.82
(%)	(3.2)	(6.2)	(18.7)	(35.7)	(24.4)	(7.8)	(4.0)	(100.0)				
4年~	26	31	127	273	230	79	40	806	16	822	7.21	3.03
(%)	(3.2)	(3.8)	(15.8)	(33.9)	(28.5)	(9.8)	(5.0)	(100.0)				
6年~	13	12	51	145	118	37	23	399	8	407	7.35	2.88
(%)	(3.3)	(3.0)	(12.8)	(36.3)	(29.6)	(9.3)	(5.8)	(100.0)				
8年~	1	3	20	64	59	16	14	177	5	182	7.80	2.50
(%)	(0.6)	(1.7)	(11.3)	(36.2)	(33.3)	(9.0)	(7.9)	(100.0)				
10年~	3	2	11	55	92	26	21	210	6	216	8.24	2.42
(%)	(1.4)	(1.0)	(5.2)	(26.2)	(43.8)	(12.4)	(10.0)	(100.0)				
合計	222	416	1,092	1,880	1,266	361	198	5,435	229	5,664	6.57	2.81
(%)	(4.1)	(7.7)	(20.1)	(34.6)	(23.3)	(6.6)	(3.6)	(100.0)				
記載なし	4	23	74	117	83	14	4	319	2,632	2,951	6.35	2.11
(%)	(1.3)	(7.2)	(23.2)	(36.7)	(26.0)	(4.4)	(1.3)	(100.0)				
総計	226	439	1,166	1,997	1,349	375	202	5,754	2,861	8,615	6.56	2.77
(%)	(3.9)	(7.6)	(20.3)	(34.7)	(23.4)	(6.5)	(3.5)	(100.0)				
平均	2.27	1.80	2.37	3.12	4.06	4.35	5.02	3.20	2.25	3.17		
標準偏差	2.21	1.88	2.36	2.86	3.60	3.63	4.01	3.10	2.56	3.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5314##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査