

表 1422 一日透析液使用量(L/日) 原疾患別(腹膜透析患者)

| 原疾患                  | 2未満          | 2～           | 4～              | 6～              | 8～              | 10～          | 12～          | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 慢性糸球体腎炎<br>(%)       | 43<br>(2.4)  | 103<br>(5.7) | 319<br>(17.7)   | 655<br>(36.3)   | 490<br>(27.2)   | 125<br>(6.9) | 67<br>(3.7)  | 1,802<br>(100.0) | 864   | 2,666 | 6.84 | 2.59 |
| 慢性腎盂腎炎<br>(%)        | 3<br>(4.2)   | 5<br>(7.0)   | 13<br>(18.3)    | 23<br>(32.4)    | 20<br>(28.2)    | 4<br>(5.6)   | 3<br>(4.2)   | 71<br>(100.0)    | 26    | 97    | 6.64 | 2.64 |
| 急速進行性糸球体腎炎<br>(%)    | 2<br>(4.8)   | 4<br>(9.5)   | 7<br>(16.7)     | 10<br>(23.8)    | 12<br>(28.6)    | 4<br>(9.5)   | 3<br>(7.1)   | 42<br>(100.0)    | 19    | 61    | 6.94 | 3.15 |
| 妊娠腎/妊娠中毒症<br>(%)     |              |              | 6<br>(30.0)     | 9<br>(45.0)     | 3<br>(15.0)     | 2<br>(10.0)  |              | 20<br>(100.0)    | 4     | 24    | 6.53 | 1.84 |
| その他の分類不能の腎炎<br>(%)   | 2<br>(4.2)   | 3<br>(6.3)   | 8<br>(16.7)     | 18<br>(37.5)    | 12<br>(25.0)    | 3<br>(6.3)   | 2<br>(4.2)   | 48<br>(100.0)    | 27    | 75    | 6.93 | 2.68 |
| 多発性嚢胞腎<br>(%)        | 2<br>(1.1)   | 20<br>(10.6) | 39<br>(20.6)    | 82<br>(43.4)    | 33<br>(17.5)    | 8<br>(4.2)   | 5<br>(2.6)   | 189<br>(100.0)   | 83    | 272   | 6.30 | 2.23 |
| 腎硬化症<br>(%)          | 31<br>(4.1)  | 86<br>(11.5) | 171<br>(22.8)   | 253<br>(33.7)   | 152<br>(20.2)   | 44<br>(5.9)  | 14<br>(1.9)  | 751<br>(100.0)   | 355   | 1,106 | 6.16 | 2.68 |
| 悪性高血圧<br>(%)         | 3<br>(4.1)   | 5<br>(6.8)   | 22<br>(30.1)    | 19<br>(26.0)    | 16<br>(21.9)    | 4<br>(5.5)   | 4<br>(5.5)   | 73<br>(100.0)    | 33    | 106   | 6.40 | 2.86 |
| 糖尿病性腎症<br>(%)        | 99<br>(5.4)  | 112<br>(6.2) | 371<br>(20.4)   | 627<br>(34.4)   | 426<br>(23.4)   | 116<br>(6.4) | 70<br>(3.8)  | 1,821<br>(100.0) | 925   | 2,746 | 6.52 | 2.77 |
| SLE腎炎<br>(%)         | 1<br>(2.9)   | 2<br>(5.7)   | 9<br>(25.7)     | 10<br>(28.6)    | 9<br>(25.7)     | 4<br>(11.4)  |              | 35<br>(100.0)    | 20    | 55    | 6.50 | 2.37 |
| アミロイド腎<br>(%)        | 1<br>(9.1)   | 1<br>(9.1)   | 4<br>(36.4)     | 2<br>(18.2)     | 2<br>(18.2)     | 1<br>(9.1)   |              | 11<br>(100.0)    | 5     | 16    | 5.75 | 2.50 |
| 痛風腎<br>(%)           |              | 1<br>(6.7)   | 2<br>(13.3)     | 5<br>(33.3)     | 3<br>(20.0)     | 3<br>(20.0)  | 1<br>(6.7)   | 15<br>(100.0)    | 8     | 23    | 7.57 | 2.48 |
| 先天性代謝異常による腎不全<br>(%) |              | 1<br>(7.7)   | 5<br>(38.5)     | 4<br>(30.8)     | 2<br>(15.4)     | 1<br>(7.7)   |              | 13<br>(100.0)    | 4     | 17    | 6.15 | 2.22 |
| 腎・尿路結核<br>(%)        |              |              |                 |                 |                 |              |              |                  | 1     | 1     |      |      |
| 腎・尿路結石<br>(%)        |              | 2<br>(12.5)  | 4<br>(25.0)     | 5<br>(31.3)     | 4<br>(25.0)     | 1<br>(6.3)   |              | 16<br>(100.0)    | 5     | 21    | 6.08 | 2.23 |
| 腎・尿路腫瘍<br>(%)        |              | 1<br>(14.3)  |                 | 6<br>(85.7)     |                 |              |              | 7<br>(100.0)     | 5     | 12    | 5.70 | 1.03 |
| 閉塞性尿路障害<br>(%)       |              | 4<br>(26.7)  | 4<br>(26.7)     | 4<br>(26.7)     | 1<br>(6.7)      | 2<br>(13.3)  |              | 15<br>(100.0)    | 5     | 20    | 5.78 | 2.24 |
| 骨髄腫<br>(%)           |              | 2<br>(33.3)  | 1<br>(16.7)     | 2<br>(33.3)     | 1<br>(16.7)     |              |              | 6<br>(100.0)     | 1     | 7     | 5.47 | 2.03 |
| 腎形成不全<br>(%)         | 2<br>(4.9)   | 6<br>(14.6)  | 9<br>(22.0)     | 2<br>(4.9)      | 9<br>(22.0)     | 2<br>(4.9)   | 11<br>(26.8) | 41<br>(100.0)    | 24    | 65    | 8.79 | 5.99 |
| 不明<br>(%)            | 29<br>(5.1)  | 55<br>(9.7)  | 133<br>(23.5)   | 190<br>(33.6)   | 113<br>(20.0)   | 37<br>(6.5)  | 8<br>(1.4)   | 565<br>(100.0)   | 324   | 889   | 6.09 | 2.56 |
| 再導入<br>(%)           | 1<br>(2.3)   | 6<br>(13.6)  | 3<br>(6.8)      | 16<br>(36.4)    | 12<br>(27.3)    | 3<br>(6.8)   | 3<br>(6.8)   | 44<br>(100.0)    | 21    | 65    | 7.74 | 5.30 |
| その他<br>(%)           | 7<br>(4.1)   | 20<br>(11.8) | 36<br>(21.3)    | 55<br>(32.5)    | 29<br>(17.2)    | 11<br>(6.5)  | 11<br>(6.5)  | 169<br>(100.0)   | 102   | 271   | 6.60 | 3.70 |
| 合計<br>(%)            | 226<br>(3.9) | 439<br>(7.6) | 1,166<br>(20.3) | 1,997<br>(34.7) | 1,349<br>(23.4) | 375<br>(6.5) | 202<br>(3.5) | 5,754<br>(100.0) | 2,861 | 8,615 | 6.56 | 2.77 |
| 記載なし<br>(%)          |              |              |                 |                 |                 |              |              |                  |       |       |      |      |
| 総計<br>(%)            | 226<br>(3.9) | 439<br>(7.6) | 1,166<br>(20.3) | 1,997<br>(34.7) | 1,349<br>(23.4) | 375<br>(6.5) | 202<br>(3.5) | 5,754<br>(100.0) | 2,861 | 8,615 | 6.56 | 2.77 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5315##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査