

表 1423 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	6	50	62	112	65	23	7	325	231	556	6.31	2.43
(%)	(1.8)	(15.4)	(19.1)	(34.5)	(20.0)	(7.1)	(2.2)	(100.0)				
私立大学	17	65	181	191	156	30	20	660	489	1,149	6.25	2.55
(%)	(2.6)	(9.8)	(27.4)	(28.9)	(23.6)	(4.5)	(3.0)	(100.0)				
国立病院機構等	18	19	43	56	29	9	7	181	46	227	5.94	3.14
(%)	(9.9)	(10.5)	(23.8)	(30.9)	(16.0)	(5.0)	(3.9)	(100.0)				
県市町村立・国保	27	72	215	393	245	71	47	1,070	530	1,600	6.80	2.97
(%)	(2.5)	(6.7)	(20.1)	(36.7)	(22.9)	(6.6)	(4.4)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	6	21	32	50	47	17	3	176	320	496	6.52	2.62
(%)	(3.4)	(11.9)	(18.2)	(28.4)	(26.7)	(9.7)	(1.7)	(100.0)				
厚生連等	4	14	67	155	134	17	6	397	154	551	6.89	2.12
(%)	(1.0)	(3.5)	(16.9)	(39.0)	(33.8)	(4.3)	(1.5)	(100.0)				
その他公的	10	66	188	372	216	54	26	932	395	1,327	6.54	2.37
(%)	(1.1)	(7.1)	(20.2)	(39.9)	(23.2)	(5.8)	(2.8)	(100.0)				
私立総合	11	22	85	127	74	19	3	341	52	393	6.24	2.23
(%)	(3.2)	(6.5)	(24.9)	(37.2)	(21.7)	(5.6)	(0.9)	(100.0)				
私立	110	85	208	381	258	82	46	1,170	456	1,626	6.36	3.21
(%)	(9.4)	(7.3)	(17.8)	(32.6)	(22.1)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
私立診療所	17	25	85	160	125	53	37	502	188	690	7.25	2.94
(%)	(3.4)	(5.0)	(16.9)	(31.9)	(24.9)	(10.6)	(7.4)	(100.0)				
総計	226	439	1,166	1,997	1,349	375	202	5,754	2,861	8,615	6.56	2.77
(%)	(3.9)	(7.6)	(20.3)	(34.7)	(23.4)	(6.5)	(3.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5316##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査