

表 1424 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	140 (5.1)	308 (11.2)	758 (27.5)	1,011 (36.7)	489 (17.7)	39 (1.4)	11 (0.4)	2,756 (100.0)	1,380	4,136	5.51	2.03
腹膜透析 (APD) (%)	51 (3.5)	95 (6.5)	282 (19.4)	473 (32.5)	358 (24.6)	127 (8.7)	68 (4.7)	1,454 (100.0)	664	2,118	7.09	3.20
腹膜透析 (CCPD) (%)	7 (1.5)	16 (3.4)	47 (10.0)	146 (31.0)	129 (27.4)	76 (16.1)	50 (10.6)	471 (100.0)	206	677	8.17	2.94
合計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72
記載なし (%)												
総計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5320##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査