

表 1426 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	4 (6.6)	16 (26.2)	17 (27.9)	6 (9.8)	7 (11.5)	3 (4.9)	8 (13.1)	61 (100.0)	24	85	7.01	6.06
15歳~ (%)		2 (4.0)	9 (18.0)	16 (32.0)	10 (20.0)	3 (6.0)	10 (20.0)	50 (100.0)	29	79	9.19	5.93
30歳~ (%)	5 (1.7)	15 (5.0)	59 (19.8)	103 (34.6)	74 (24.8)	22 (7.4)	20 (6.7)	298 (100.0)	161	459	7.29	3.66
45歳~ (%)	33 (3.0)	60 (5.5)	189 (17.3)	398 (36.5)	290 (26.6)	83 (7.6)	38 (3.5)	1,091 (100.0)	559	1,650	6.78	2.47
60歳~ (%)	74 (3.6)	141 (6.8)	475 (22.9)	757 (36.6)	476 (23.0)	101 (4.9)	46 (2.2)	2,070 (100.0)	926	2,996	6.32	2.39
75歳~ (%)	73 (7.0)	159 (15.2)	319 (30.6)	339 (32.5)	116 (11.1)	30 (2.9)	7 (0.7)	1,043 (100.0)	499	1,542	5.29	2.31
90歳~ (%)	9 (13.2)	26 (38.2)	19 (27.9)	11 (16.2)	3 (4.4)			68 (100.0)	52	120	3.95	1.89
合計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72
平均	69.02	68.82	66.38	63.91	61.05	59.54	51.82	63.98	63.88	63.95		
標準偏差	15.99	18.64	15.10	13.34	12.74	13.81	18.68	14.87	15.21	14.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5322##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査