

表 1427 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

PD歴	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	67	173	339	398	166	34	9	1,186	83	1,269	5.47	2.37
(%)	(5.6)	(14.6)	(28.6)	(33.6)	(14.0)	(2.9)	(0.8)	(100.0)				
1年~	57	99	262	378	209	40	25	1,070	45	1,115	6.05	2.60
(%)	(5.3)	(9.3)	(24.5)	(35.3)	(19.5)	(3.7)	(2.3)	(100.0)				
2年~	39	82	260	441	272	79	44	1,217	53	1,270	6.60	2.78
(%)	(3.2)	(6.7)	(21.4)	(36.2)	(22.4)	(6.5)	(3.6)	(100.0)				
4年~	17	28	115	201	150	44	26	581	10	591	6.94	3.06
(%)	(2.9)	(4.8)	(19.8)	(34.6)	(25.8)	(7.6)	(4.5)	(100.0)				
6年~	10	11	42	82	65	17	9	236	2	238	6.84	2.91
(%)	(4.2)	(4.7)	(17.8)	(34.7)	(27.5)	(7.2)	(3.8)	(100.0)				
8年~	1	3	12	33	26	7	4	86	3	89	7.31	2.44
(%)	(1.2)	(3.5)	(14.0)	(38.4)	(30.2)	(8.1)	(4.7)	(100.0)				
10年~	3	2	5	26	42	12	10	100	2	102	8.09	2.62
(%)	(3.0)	(2.0)	(5.0)	(26.0)	(42.0)	(12.0)	(10.0)	(100.0)				
合計	194	398	1,035	1,559	930	233	127	4,476	198	4,674	6.27	2.74
(%)	(4.3)	(8.9)	(23.1)	(34.8)	(20.8)	(5.2)	(2.8)	(100.0)				
記載なし	4	21	52	71	46	9	2	205	2,052	2,257	6.08	2.17
(%)	(2.0)	(10.2)	(25.4)	(34.6)	(22.4)	(4.4)	(1.0)	(100.0)				
総計	198	419	1,087	1,630	976	242	129	4,681	2,250	6,931	6.27	2.72
(%)	(4.2)	(9.0)	(23.2)	(34.8)	(20.9)	(5.2)	(2.8)	(100.0)				
平均	2.09	1.76	2.19	2.66	3.32	3.66	4.27	2.68	1.77	2.64		
標準偏差	2.20	1.87	2.08	2.51	3.04	3.22	3.87	2.64	2.00	2.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5323##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査