

表 1430 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	100未満	100 ~	400 ~	800 ~	1200 ~	1600 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	519 (18.9)	496 (18.1)	622 (22.7)	580 (21.2)	324 (11.8)	200 (7.3)	2,741 (100.0)	2,232	4,973	670.72	581.25
腹膜透析 (APD) (%)	306 (20.1)	273 (17.9)	345 (22.6)	309 (20.3)	178 (11.7)	113 (7.4)	1,524 (100.0)	1,113	2,637	659.98	578.36
腹膜透析 (CCPD) (%)	210 (35.2)	130 (21.8)	108 (18.1)	99 (16.6)	28 (4.7)	21 (3.5)	596 (100.0)	409	1,005	432.46	495.22
合計 (%)	1,035 (21.3)	899 (18.5)	1,075 (22.1)	988 (20.3)	530 (10.9)	334 (6.9)	4,861 (100.0)	3,754	8,615	638.14	575.55
記載なし (%)											
総計 (%)	1,035 (21.3)	899 (18.5)	1,075 (22.1)	988 (20.3)	530 (10.9)	334 (6.9)	4,861 (100.0)	3,754	8,615	638.14	575.55

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5410##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査