

表 1434 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	34 (%)	113 (11.3)	214 (21.3)	336 (33.5)	187 (18.6)	120 (12.0)	1,004 (100.0)	308	1,312	952.84	536.16
1年～	97 (%)	148 (14.9)	264 (26.5)	262 (26.3)	128 (12.9)	96 (9.6)	995 (100.0)	212	1,207	796.47	571.81
2年～	220 (%)	285 (22.6)	326 (25.8)	233 (18.4)	121 (9.6)	78 (6.2)	1,263 (100.0)	255	1,518	612.08	546.36
4年～	221 (%)	174 (24.6)	156 (22.1)	87 (12.3)	48 (6.8)	20 (2.8)	706 (100.0)	116	822	439.79	483.26
6年～	167 (%)	79 (23.0)	44 (12.8)	30 (8.7)	16 (4.7)	7 (2.0)	343 (100.0)	64	407	305.52	447.35
8年～	104 (%)	28 (17.8)	12 (7.6)	5 (3.2)	3 (1.9)	5 (3.2)	157 (100.0)	25	182	188.61	438.98
10年～	145 (%)	22 (11.6)	14 (7.4)	4 (2.1)	4 (2.1)	1 (0.5)	190 (100.0)	26	216	119.51	302.19
合計	988 (%)	849 (18.2)	1,030 (22.1)	957 (20.5)	507 (10.9)	327 (7.0)	4,658 (100.0)	1,006	5,664	641.87	575.83
記載なし	47 (%)	50 (24.6)	45 (22.2)	31 (15.3)	23 (11.3)	7 (3.4)	203 (100.0)	2,748	2,951	552.66	563.73
総計	1,035 (%)	899 (18.5)	1,075 (22.1)	988 (20.3)	530 (10.9)	334 (6.9)	4,861 (100.0)	3,754	8,615	638.14	575.55
平均	6.02	3.56	2.63	1.99	2.00	1.81	3.26	2.72	3.17		
標準偏差	4.12	2.76	2.28	1.84	1.97	1.77	3.14	2.78	3.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5414##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査