

表 1437 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	100未満	100 ~	400 ~	800 ~	1200 ~	1600 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	274 (11.9)	386 (16.7)	572 (24.8)	567 (24.5)	314 (13.6)	198 (8.6)	2,311 (100.0)	1,825	4,136	761.23	574.44
腹膜透析 (APD) (%)	156 (12.4)	211 (16.8)	313 (24.9)	298 (23.7)	169 (13.5)	109 (8.7)	1,256 (100.0)	862	2,118	751.30	564.01
腹膜透析 (CCPD) (%)	95 (23.2)	89 (21.8)	92 (22.5)	86 (21.0)	26 (6.4)	21 (5.1)	409 (100.0)	268	677	554.83	520.23
合計 (%)	525 (13.2)	686 (17.3)	977 (24.6)	951 (23.9)	509 (12.8)	328 (8.2)	3,976 (100.0)	2,955	6,931	736.86	569.03
記載なし (%)											
総計 (%)	525 (13.2)	686 (17.3)	977 (24.6)	951 (23.9)	509 (12.8)	328 (8.2)	3,976 (100.0)	2,955	6,931	736.86	569.03

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5420##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査