

表 1443 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	- 1000未満	- 1000 ~	0 ~	1000 ~	2000 ~	3000 ~	4000 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	5 (0.2)	205 (6.7)	2,009 (65.8)	786 (25.7)	47 (1.5)		2 (0.1)	3,054 (100.0)	1,919 (100.0)	4,973	649.65	533.25
腹膜透析 (APD) (%)	1 (0.1)	67 (4.0)	1,187 (70.9)	395 (23.6)	22 (1.3)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,675 (100.0)	962 (100.0)	2,637	646.20	491.72
腹膜透析 (CCPD) (%)		13 (2.0)	378 (58.7)	242 (37.6)	11 (1.7)			644 (100.0)	361 (100.0)	1,005	825.27	475.38
合計 (%)	6 (0.1)	285 (5.3)	3,574 (66.5)	1,423 (26.5)	80 (1.5)	2 (0.0)	3 (0.1)	5,373 (100.0)	3,242 (100.0)	8,615	669.62	517.01
記載なし (%)												
総計 (%)	6 (0.1)	285 (5.3)	3,574 (66.5)	1,423 (26.5)	80 (1.5)	2 (0.0)	3 (0.1)	5,373 (100.0)	3,242 (100.0)	8,615	669.62	517.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5510##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査