

表 1450 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	- 1000未満	- 1000 ~	0 ~	1000 ~	2000 ~	3000 ~	4000 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	5 (0.2)	195 (7.6)	1,753 (68.7)	569 (22.3)	29 (1.1)		2 (0.1)	2,553 (100.0)	1,583	4,136	597.11	524.72
腹膜透析 (APD) (%)	1 (0.1)	66 (4.8)	1,017 (73.6)	280 (20.3)	15 (1.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,381 (100.0)	737	2,118	594.34	481.93
腹膜透析 (CCPD) (%)		11 (2.4)	285 (63.5)	147 (32.7)	6 (1.3)			449 (100.0)	228	677	766.38	474.65
合計 (%)	6 (0.1)	272 (6.2)	3,055 (69.7)	996 (22.7)	50 (1.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	4,383 (100.0)	2,548	6,931	613.58	509.11
記載なし (%)												
総計 (%)	6 (0.1)	272 (6.2)	3,055 (69.7)	996 (22.7)	50 (1.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	4,383 (100.0)	2,548	6,931	613.58	509.11

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5520##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査