

表 1459 APD使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)		59 (100.0)	59 (100.0)		26	85
15歳～ (%)	13 (21.3)	48 (78.7)	61 (100.0)		33	94
30歳～ (%)	200 (50.1)	199 (49.9)	399 (100.0)	2	207	608
45歳～ (%)	712 (48.1)	767 (51.9)	1,479 (100.0)	4	800	2,283
60歳～ (%)	1,494 (59.5)	1,015 (40.5)	2,509 (100.0)	7	1,202	3,718
75歳～ (%)	768 (66.8)	381 (33.2)	1,149 (100.0)		552	1,701
90歳～ (%)	51 (68.9)	23 (31.1)	74 (100.0)		52	126
合計 (%)	3,238 (56.5)	2,492 (43.5)	5,730 (100.0)	13	2,872	8,615
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	3,238 (56.5)	2,492 (43.5)	5,730 (100.0)	13	2,872	8,615
平均	65.64	60.17	63.26	58.15	62.97	63.16
標準偏差	12.70	15.89	14.43	10.37	14.59	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5613##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査