

表 1467 APD使用の有無 原疾患別 (腹膜透析単独患者)

原疾患	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	819 (59.7)	554 (40.3)	1,373 (100.0)	2	635	2,010
慢性腎孟腎炎 (%)	29 (49.2)	30 (50.8)	59 (100.0)	1	21	81
急速進行性糸球体腎炎 (%)	19 (52.8)	17 (47.2)	36 (100.0)	1	16	53
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	9 (64.3)	5 (35.7)	14 (100.0)		3	17
その他の分類不能の腎炎 (%)	17 (47.2)	19 (52.8)	36 (100.0)	1	17	54
多発性囊胞腎 (%)	75 (47.2)	84 (52.8)	159 (100.0)		69	228
腎硬化症 (%)	389 (60.3)	256 (39.7)	645 (100.0)		298	943
悪性高血圧 (%)	33 (58.9)	23 (41.1)	56 (100.0)		31	87
糖尿病性腎症 (%)	872 (58.0)	631 (42.0)	1,503 (100.0)	2	742	2,247
SLE腎炎 (%)	18 (62.1)	11 (37.9)	29 (100.0)		17	46
アミロイド腎 (%)	6 (60.0)	4 (40.0)	10 (100.0)		4	14
痛風腎 (%)	4 (40.0)	6 (60.0)	10 (100.0)		5	15
先天性代謝異常による腎不全 (%)	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)		3	15
腎・尿路結核 (%)					1	1
腎・尿路結石 (%)	6 (60.0)	4 (40.0)	10 (100.0)		7	17
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (50.0)	4 (50.0)	8 (100.0)		1	9
閉塞性尿路障害 (%)	9 (64.3)	5 (35.7)	14 (100.0)		3	17
骨髓腫 (%)	2 (40.0)	3 (60.0)	5 (100.0)		2	7
腎形成不全 (%)	5 (13.9)	31 (86.1)	36 (100.0)		22	58
不明 (%)	300 (62.9)	177 (37.1)	477 (100.0)	2	257	736
再導入 (%)	23 (60.5)	15 (39.5)	38 (100.0)		12	50
その他 (%)	71 (50.0)	71 (50.0)	142 (100.0)		84	226
合計 (%)	2,715 (58.1)	1,957 (41.9)	4,672 (100.0)	9	2,250	6,931
記載なし (%)						
総計 (%)	2,715 (58.1)	1,957 (41.9)	4,672 (100.0)	9	2,250	6,931

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D5624##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査