

表 1469 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	146 (4.6)	138 (4.3)	249 (7.8)	273 (8.6)	111 (3.5)	2,273 (71.3)	3,190 (100.0)	1,783	4,973	20.36	6.39
腹膜透析 (APD) (%)	5 (0.3)	692 (39.1)	331 (18.7)	77 (4.3)	61 (3.4)	606 (34.2)	1,772 (100.0)	865	2,637	14.38	7.43
腹膜透析 (CCPD) (%)	3 (0.5)	77 (11.7)	82 (12.4)	76 (11.5)	79 (12.0)	343 (52.0)	660 (100.0)	345	1,005	18.79	6.38
合計 (%)	154 (2.7)	907 (16.1)	662 (11.8)	426 (7.6)	251 (4.5)	3,222 (57.3)	5,622 (100.0)	2,993	8,615	18.29	7.25
記載なし (%)											
総計 (%)	154 (2.7)	907 (16.1)	662 (11.8)	426 (7.6)	251 (4.5)	3,222 (57.3)	5,622 (100.0)	2,993	8,615	18.29	7.25

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5710##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査