

表 1470 1日のPD実施時間(時間/日) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

| 併用の状況 | 1 ~ | 5 ~ | 9 ~ | 13 ~ | 18 ~ | 24 | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|----------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| PD単独 | 135 | 805 | 587 | 350 | 188 | 2,514 | 4,579 | 2,352 | 6,931 | 17.87 | 7.39 |
| (%) | (2.9) | (17.6) | (12.8) | (7.6) | (4.1) | (54.9) | (100.0) | | | | |
| PD.HD併用週1HD(F) | 17 | 93 | 65 | 63 | 59 | 627 | 924 | 572 | 1,496 | 20.15 | 6.33 |
| (%) | (1.8) | (10.1) | (7.0) | (6.8) | (6.4) | (67.9) | (100.0) | | | | |
| PD.HD併用週2HD(F) | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 55 | 85 | 35 | 120 | 19.80 | 6.33 |
| (%) | (2.4) | (5.9) | (10.6) | (11.8) | (4.7) | (64.7) | (100.0) | | | | |
| PD.HD併用週3HD(F) | | | | | | | | | | | |
| (%) | | | | | | | | | | | |
| PD.HD併用週4HD(F) | | | | | | | | | | | |
| (%) | | | | | | | | | | | |
| PD.HD併用その他 | | 4 | 1 | 3 | | 25 | 33 | 16 | 49 | 20.97 | 5.75 |
| (%) | | (12.1) | (3.0) | (9.1) | | (75.8) | (100.0) | | | | |
| 合計 | 154 | 907 | 662 | 426 | 251 | 3,221 | 5,621 | 2,975 | 8,596 | 18.29 | 7.25 |
| (%) | (2.7) | (16.1) | (11.8) | (7.6) | (4.5) | (57.3) | (100.0) | | | | |
| 不明 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 24.00 | |
| (%) | | | | | | (100.0) | (100.0) | | | | |
| 記載なし | | | | | | | | 15 | 15 | | |
| (%) | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 154 | 907 | 662 | 426 | 251 | 3,222 | 5,622 | 2,993 | 8,615 | 18.29 | 7.25 |
| (%) | (2.7) | (16.1) | (11.8) | (7.6) | (4.5) | (57.3) | (100.0) | | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5711##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査