

表 1476 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	127 (4.8)	131 (4.9)	232 (8.7)	241 (9.0)	96 (3.6)	1,841 (69.0)	2,668 (100.0)	1,468	4,136	20.06	6.56
腹膜透析 (APD) (%)	5 (0.3)	614 (42.3)	287 (19.8)	56 (3.9)	39 (2.7)	451 (31.1)	1,452 (100.0)	666	2,118	13.74	7.31
腹膜透析 (CCPD) (%)	3 (0.7)	60 (13.1)	68 (14.8)	53 (11.5)	53 (11.5)	222 (48.4)	459 (100.0)	218	677	18.18	6.58
合計 (%)	135 (2.9)	805 (17.6)	587 (12.8)	350 (7.6)	188 (4.1)	2,514 (54.9)	4,579 (100.0)	2,352	6,931	17.87	7.39
記載なし (%)											
総計 (%)	135 (2.9)	805 (17.6)	587 (12.8)	350 (7.6)	188 (4.1)	2,514 (54.9)	4,579 (100.0)	2,352	6,931	17.87	7.39

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5720##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査