

表 1482 PD透析液交換方法 治療方法 (新分類) 別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス			合計	不明	記載なし	総計
		紫外線	熱式無菌 接合装置	左記以外、 半手動も 含む				
腹膜透析 (CAPD) (%)	1,015 (31.4)	1,660 (51.3)	502 (15.5)	58 (1.8)	3,235 (100.0)	13	1,725	4,973
腹膜透析 (APD) (%)	382 (21.5)	1,021 (57.4)	300 (16.9)	75 (4.2)	1,778 (100.0)	14	845	2,637
腹膜透析 (CCPD) (%)	180 (26.9)	347 (51.8)	111 (16.6)	32 (4.8)	670 (100.0)		335	1,005
合計 (%)	1,577 (27.7)	3,028 (53.3)	913 (16.1)	165 (2.9)	5,683 (100.0)	27	2,905	8,615
記載なし (%)								
総計 (%)	1,577 (27.7)	3,028 (53.3)	913 (16.1)	165 (2.9)	5,683 (100.0)	27	2,905	8,615

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバッグ交換の両方を行うもの
 ##D5810##
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2016年調査