

表 1483 PD透析液交換方法 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	完全手動式	バッグ交換デバイス			合計	不明	記載なし	総計
		紫外線	熱式無菌 接合装置	左記以外、 半手動も 含む				
PD単独	1,258	2,478	775	129	4,640	19	2,272	6,931
(%)	(27.1)	(53.4)	(16.7)	(2.8)	(100.0)			
PD.HD併用週1HD(F)	287	494	125	22	928	6	562	1,496
(%)	(30.9)	(53.2)	(13.5)	(2.4)	(100.0)			
PD.HD併用週2HD(F)	18	41	11	12	82	1	37	120
(%)	(22.0)	(50.0)	(13.4)	(14.6)	(100.0)			
PD.HD併用週3HD(F)								
(%)								
PD.HD併用週4HD(F)								
(%)								
PD.HD併用その他	14	14	2	2	32	1	16	49
(%)	(43.8)	(43.8)	(6.3)	(6.3)	(100.0)			
合計	1,577	3,027	913	165	5,682	27	2,887	8,596
(%)	(27.8)	(53.3)	(16.1)	(2.9)	(100.0)			
不明		1			1		3	4
(%)		(100.0)			(100.0)			
記載なし							15	15
(%)								
総計	1,577	3,028	913	165	5,683	27	2,905	8,615
(%)	(27.7)	(53.3)	(16.1)	(2.9)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5811##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査