

表 1485 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス			合計	不明	記載なし	総計
		紫外線	熱式無菌 接合装置	左記以外、 半手動も 含む				
15歳未満	18	30	8	3	59		26	85
(%)	(30.5)	(50.8)	(13.6)	(5.1)	(100.0)			
15歳～	14	30	13	3	60		34	94
(%)	(23.3)	(50.0)	(21.7)	(5.0)	(100.0)			
30歳～	127	176	73	10	386	3	219	608
(%)	(32.9)	(45.6)	(18.9)	(2.6)	(100.0)			
45歳～	439	750	233	44	1,466	8	809	2,283
(%)	(29.9)	(51.2)	(15.9)	(3.0)	(100.0)			
60歳～	675	1,364	387	64	2,490	13	1,215	3,718
(%)	(27.1)	(54.8)	(15.5)	(2.6)	(100.0)			
75歳～	288	640	181	39	1,148	3	550	1,701
(%)	(25.1)	(55.7)	(15.8)	(3.4)	(100.0)			
90歳～	16	38	18	2	74		52	126
(%)	(21.6)	(51.4)	(24.3)	(2.7)	(100.0)			
合計	1,577	3,028	913	165	5,683	27	2,905	8,615
(%)	(27.7)	(53.3)	(16.1)	(2.9)	(100.0)			
不明								
(%)								
記載なし								
(%)								
総計	1,577	3,028	913	165	5,683	27	2,905	8,615
(%)	(27.7)	(53.3)	(16.1)	(2.9)	(100.0)			
平均	62.14	64.04	62.94	63.33	63.32	61.96	62.85	63.16
標準偏差	14.46	14.22	14.61	15.56	14.41	11.38	14.65	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5813##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査