

表 1489 PD透析液交換方法 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス			合計	不明	記載なし	総計
		紫外線	熱式無菌接合装置	左記以外、半手動も含む				
腹膜透析 (CAPD) (%)	821 (30.3)	1,416 (52.2)	434 (16.0)	41 (1.5)	2,712 (100.0)	11	1,413	4,136
腹膜透析 (APD) (%)	316 (21.6)	819 (56.1)	258 (17.7)	67 (4.6)	1,460 (100.0)	8	650	2,118
腹膜透析 (CCPD) (%)	121 (25.9)	243 (51.9)	83 (17.7)	21 (4.5)	468 (100.0)		209	677
合計 (%)	1,258 (27.1)	2,478 (53.4)	775 (16.7)	129 (2.8)	4,640 (100.0)	19	2,272	6,931
記載なし (%)								
総計 (%)	1,258 (27.1)	2,478 (53.4)	775 (16.7)	129 (2.8)	4,640 (100.0)	19	2,272	6,931

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5820##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査