

表 1491 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス			合計	不明	記載なし	総計
		紫外線	熱式無菌 接合装置	左記以外、 半手動も 含む				
15歳未満	18	30	8	3	59		26	85
(%)	(30.5)	(50.8)	(13.6)	(5.1)	(100.0)			
15歳～	11	28	10	3	52		27	79
(%)	(21.2)	(53.8)	(19.2)	(5.8)	(100.0)			
30歳～	98	129	53	7	287	1	171	459
(%)	(34.1)	(44.9)	(18.5)	(2.4)	(100.0)			
45歳～	329	539	193	30	1,091	5	554	1,650
(%)	(30.2)	(49.4)	(17.7)	(2.7)	(100.0)			
60歳～	544	1,123	326	50	2,043	10	943	2,996
(%)	(26.6)	(55.0)	(16.0)	(2.4)	(100.0)			
75歳～	242	594	169	34	1,039	3	500	1,542
(%)	(23.3)	(57.2)	(16.3)	(3.3)	(100.0)			
90歳～	16	35	16	2	69		51	120
(%)	(23.2)	(50.7)	(23.2)	(2.9)	(100.0)			
合計	1,258	2,478	775	129	4,640	19	2,272	6,931
(%)	(27.1)	(53.4)	(16.7)	(2.8)	(100.0)			
不明								
(%)								
記載なし								
(%)								
総計	1,258	2,478	775	129	4,640	19	2,272	6,931
(%)	(27.1)	(53.4)	(16.7)	(2.8)	(100.0)			
平均	62.50	64.91	63.67	63.95	64.03	64.37	63.78	63.95
標準偏差	14.99	14.65	14.73	16.31	14.84	10.39	15.31	14.98

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5822##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査