

表 1497 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析患者)

性別	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,956	373	97	22	10	16	3,474		2,128	5,602	0.25	0.87
(%)	(85.1)	(10.7)	(2.8)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
女性	1,638	184	40	7	5	7	1,881		1,132	3,013	0.20	0.75
(%)	(87.1)	(9.8)	(2.1)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					
合計	4,594	557	137	29	15	23	5,355		3,260	8,615	0.23	0.83
(%)	(85.8)	(10.4)	(2.6)	(0.5)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					
記載なし												
(%)												
総計	4,594	557	137	29	15	23	5,355		3,260	8,615	0.23	0.83
(%)	(85.8)	(10.4)	(2.6)	(0.5)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5912##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査