

表 1498 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

| 年齢           | 0               | 1.0 ~         | 2.0 ~        | 3.0 ~       | 4.0 ~       | 5.0 ~       | 合計               | 不明 | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----|-------|-------|------|------|
| 15歳未満<br>(%) | 50<br>(84.7)    | 8<br>(13.6)   |              |             |             | 1<br>(1.7)  | 59<br>(100.0)    |    | 26    | 85    | 0.23 | 0.73 |
| 15歳 ~<br>(%) | 54<br>(91.5)    | 3<br>(5.1)    |              | 1<br>(1.7)  | 1<br>(1.7)  |             | 59<br>(100.0)    |    | 35    | 94    | 0.18 | 0.69 |
| 30歳 ~<br>(%) | 340<br>(89.9)   | 26<br>(6.9)   | 7<br>(1.9)   | 1<br>(0.3)  | 1<br>(0.3)  | 3<br>(0.8)  | 378<br>(100.0)   |    | 230   | 608   | 0.20 | 0.89 |
| 45歳 ~<br>(%) | 1,191<br>(86.5) | 135<br>(9.8)  | 38<br>(2.8)  | 3<br>(0.2)  | 3<br>(0.2)  | 7<br>(0.5)  | 1,377<br>(100.0) |    | 906   | 2,283 | 0.22 | 0.76 |
| 60歳 ~<br>(%) | 2,014<br>(86.3) | 233<br>(10.0) | 56<br>(2.4)  | 19<br>(0.8) | 6<br>(0.3)  | 6<br>(0.3)  | 2,334<br>(100.0) |    | 1,384 | 3,718 | 0.22 | 0.78 |
| 75歳 ~<br>(%) | 890<br>(82.5)   | 142<br>(13.2) | 32<br>(3.0)  | 5<br>(0.5)  | 4<br>(0.4)  | 6<br>(0.6)  | 1,079<br>(100.0) |    | 622   | 1,701 | 0.29 | 1.01 |
| 90歳 ~<br>(%) | 55<br>(79.7)    | 10<br>(14.5)  | 4<br>(5.8)   |             |             |             | 69<br>(100.0)    |    | 57    | 126   | 0.27 | 0.57 |
| 合計<br>(%)    | 4,594<br>(85.8) | 557<br>(10.4) | 137<br>(2.6) | 29<br>(0.5) | 15<br>(0.3) | 23<br>(0.4) | 5,355<br>(100.0) |    | 3,260 | 8,615 | 0.23 | 0.83 |
| 不明<br>(%)    |                 |               |              |             |             |             |                  |    |       |       |      |      |
| 記載なし<br>(%)  |                 |               |              |             |             |             |                  |    |       |       |      |      |
| 総計<br>(%)    | 4,594<br>(85.8) | 557<br>(10.4) | 137<br>(2.6) | 29<br>(0.5) | 15<br>(0.3) | 23<br>(0.4) | 5,355<br>(100.0) |    | 3,260 | 8,615 | 0.23 | 0.83 |
| 平均           | 62.96           | 64.92         | 65.18        | 64.55       | 62.87       | 60.52       | 63.22            |    | 63.06 | 63.16 |      |      |
| 標準偏差         | 14.57           | 14.74         | 12.92        | 13.21       | 18.70       | 18.26       | 14.58            |    | 14.33 | 14.48 |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

#D5913##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査