

表 1499 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	1,047	73	40	10	8	15	1,193		119	1,312	0.34	1.28
(%)	(87.8)	(6.1)	(3.4)	(0.8)	(0.7)	(1.3)	(100.0)					
1年 ~	933	141	29	5	3	3	1,114		93	1,207	0.24	0.85
(%)	(83.8)	(12.7)	(2.6)	(0.4)	(0.3)	(0.3)	(100.0)					
2年 ~	1,211	174	35	6	2	2	1,430		88	1,518	0.20	0.56
(%)	(84.7)	(12.2)	(2.4)	(0.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)					
4年 ~	655	79	20	3		1	758		64	822	0.18	0.50
(%)	(86.4)	(10.4)	(2.6)	(0.4)		(0.1)	(100.0)					
6年 ~	335	40	3	2			380		27	407	0.14	0.41
(%)	(88.2)	(10.5)	(0.8)	(0.5)			(100.0)					
8年 ~	139	13	5		1		158		24	182	0.17	0.53
(%)	(88.0)	(8.2)	(3.2)		(0.6)		(100.0)					
10年 ~	179	20	3	2			204		12	216	0.16	0.47
(%)	(87.7)	(9.8)	(1.5)	(1.0)			(100.0)					
合計	4,499	540	135	28	14	21	5,237		427	5,664	0.23	0.82
(%)	(85.9)	(10.3)	(2.6)	(0.5)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					
記載なし	95	17	2	1	1	2	118		2,833	2,951	0.37	1.15
(%)	(80.5)	(14.4)	(1.7)	(0.8)	(0.8)	(1.7)	(100.0)					
総計	4,594	557	137	29	15	23	5,355		3,260	8,615	0.23	0.83
平均	3.19	3.30	2.79	2.96	1.40	0.81	3.18		3.03	3.17		
標準偏差	3.12	2.84	3.22	3.18	2.09	1.27	3.09		3.02	3.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5914##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査