

表 1500 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1,456 (87.1)	164 (9.8)	33 (2.0)	14 (0.8)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,672 (100.0)		994	2,666	0.18	0.55
慢性腎盂腎炎 (%)	61 (83.6)	8 (11.0)	4 (5.5)				73 (100.0)		24	97	0.24	0.57
急速進行性糸球体腎炎 (%)	36 (90.0)	2 (5.0)	2 (5.0)				40 (100.0)		21	61	0.16	0.52
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	17 (94.4)	1 (5.6)					18 (100.0)		6	24	0.06	0.24
その他の分類不能の腎炎 (%)	45 (93.8)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)			48 (100.0)		27	75	0.13	0.53
多発性嚢胞腎 (%)	148 (84.6)	24 (13.7)	1 (0.6)			2 (1.1)	175 (100.0)		97	272	0.25	0.93
腎硬化症 (%)	609 (85.4)	78 (10.9)	18 (2.5)	4 (0.6)	1 (0.1)	3 (0.4)	713 (100.0)		393	1,106	0.23	0.75
悪性高血圧 (%)	60 (89.6)	2 (3.0)	3 (4.5)		1 (1.5)	1 (1.5)	67 (100.0)		39	106	0.30	1.09
糖尿病性腎症 (%)	1,407 (84.1)	187 (11.2)	56 (3.3)	6 (0.4)	7 (0.4)	10 (0.6)	1,673 (100.0)		1,073	2,746	0.28	1.02
SLE腎炎 (%)	27 (84.4)	3 (9.4)	2 (6.3)				32 (100.0)		23	55	0.22	0.56
アミロイド腎 (%)	11 (100.0)						11 (100.0)		5	16		
痛風腎 (%)	15 (93.8)		1 (6.3)				16 (100.0)		7	23	0.13	0.50
先天性代謝異常による腎不全 (%)	12 (85.7)	2 (14.3)					14 (100.0)		3	17	0.17	0.43
腎・尿路結核 (%)									1	1		
腎・尿路結石 (%)	13 (86.7)	2 (13.3)					15 (100.0)		6	21	0.13	0.35
腎・尿路腫瘍 (%)	5 (62.5)	2 (25.0)	1 (12.5)				8 (100.0)		4	12	0.50	0.76
閉塞性尿路障害 (%)	12 (92.3)	1 (7.7)					13 (100.0)		7	20	0.08	0.28
骨髄腫 (%)	5 (83.3)	1 (16.7)					6 (100.0)		1	7	0.17	0.41
腎形成不全 (%)	33 (89.2)	4 (10.8)					37 (100.0)		28	65	0.11	0.31
不明 (%)	459 (85.8)	55 (10.3)	12 (2.2)	4 (0.7)	2 (0.4)	3 (0.6)	535 (100.0)		354	889	0.26	0.99
再導入 (%)	28 (77.8)	6 (16.7)	1 (2.8)			1 (2.8)	36 (100.0)		29	65	0.43	1.11
その他 (%)	135 (88.2)	14 (9.2)	2 (1.3)			2 (1.3)	153 (100.0)		118	271	0.24	1.11
合計 (%)	4,594 (85.8)	557 (10.4)	137 (2.6)	29 (0.5)	15 (0.3)	23 (0.4)	5,355 (100.0)		3,260	8,615	0.23	0.83
記載なし (%)												
総計 (%)	4,594 (85.8)	557 (10.4)	137 (2.6)	29 (0.5)	15 (0.3)	23 (0.4)	5,355 (100.0)		3,260	8,615	0.23	0.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5915##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査