

表 1501 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析患者)

| 医療機関 | 0 | 1.0～ | 2.0～ | 3.0～ | 4.0～ | 5.0～ | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|----|-------|-------|------|------|
| 国公立大学 | 234 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 273 | | 283 | 556 | 0.27 | 1.00 |
| (%) | (85.7) | (9.5) | (2.9) | (0.4) | (0.4) | (1.1) | (100.0) | | | | | |
| 私立大学 | 615 | 64 | 16 | 1 | 1 | | 697 | | 452 | 1,149 | 0.16 | 0.47 |
| (%) | (88.2) | (9.2) | (2.3) | (0.1) | (0.1) | | (100.0) | | | | | |
| 国立病院機構等 | 155 | 19 | 3 | 2 | | 1 | 180 | | 47 | 227 | 0.22 | 0.74 |
| (%) | (86.1) | (10.6) | (1.7) | (1.1) | | (0.6) | (100.0) | | | | | |
| 県市町村立・国保 | 934 | 106 | 20 | 7 | 8 | 4 | 1,079 | | 521 | 1,600 | 0.23 | 0.82 |
| (%) | (86.6) | (9.8) | (1.9) | (0.6) | (0.7) | (0.4) | (100.0) | | | | | |
| JCHO(旧社会保険)等 | 123 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 149 | | 347 | 496 | 0.39 | 1.41 |
| (%) | (82.6) | (12.8) | (1.3) | (0.7) | (0.7) | (2.0) | (100.0) | | | | | |
| 厚生連等 | 342 | 38 | 9 | 1 | | 1 | 391 | | 160 | 551 | 0.18 | 0.74 |
| (%) | (87.5) | (9.7) | (2.3) | (0.3) | | (0.3) | (100.0) | | | | | |
| その他公的 | 802 | 96 | 31 | 4 | 1 | 3 | 937 | | 390 | 1,327 | 0.22 | 0.73 |
| (%) | (85.6) | (10.2) | (3.3) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | (100.0) | | | | | |
| 私立総合 | 177 | 22 | 6 | 3 | 1 | | 209 | | 184 | 393 | 0.24 | 0.64 |
| (%) | (84.7) | (10.5) | (2.9) | (1.4) | (0.5) | | (100.0) | | | | | |
| 私立 | 797 | 131 | 35 | 7 | 1 | 6 | 977 | | 649 | 1,626 | 0.31 | 1.08 |
| (%) | (81.6) | (13.4) | (3.6) | (0.7) | (0.1) | (0.6) | (100.0) | | | | | |
| 私立診療所 | 415 | 36 | 7 | 2 | 1 | 2 | 463 | | 227 | 690 | 0.17 | 0.69 |
| (%) | (89.6) | (7.8) | (1.5) | (0.4) | (0.2) | (0.4) | (100.0) | | | | | |
| 総計 | 4,594 | 557 | 137 | 29 | 15 | 23 | 5,355 | | 3,260 | 8,615 | 0.23 | 0.83 |
| (%) | (85.8) | (10.4) | (2.6) | (0.5) | (0.3) | (0.4) | (100.0) | | | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5916##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査