

表 1503 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析単独患者)

性別	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,368	301	83	18	9	14	2,793		1,616	4,409	0.26	0.92
(%)	(84.8)	(10.8)	(3.0)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
女性	1,397	159	38	7	5	7	1,613		909	2,522	0.22	0.79
(%)	(86.6)	(9.9)	(2.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					
合計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
記載なし												
(%)												
総計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5918##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査