

表 1504 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別(腹膜透析単独患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満	50	8				1	59		26	85	0.23	0.73
(%)	(84.7)	(13.6)				(1.7)	(100.0)					
15歳～	47	3		1	1		52		27	79	0.21	0.74
(%)	(90.4)	(5.8)		(1.9)	(1.9)		(100.0)					
30歳～	257	15	6		1	3	282		177	459	0.20	1.00
(%)	(91.1)	(5.3)	(2.1)		(0.4)	(1.1)	(100.0)					
45歳～	892	105	30	2	2	5	1,036		614	1,650	0.22	0.74
(%)	(86.1)	(10.1)	(2.9)	(0.2)	(0.2)	(0.5)	(100.0)					
60歳～	1,664	191	51	17	6	6	1,935		1,061	2,996	0.23	0.83
(%)	(86.0)	(9.9)	(2.6)	(0.9)	(0.3)	(0.3)	(100.0)					
75歳～	803	130	30	5	4	6	978		564	1,542	0.31	1.06
(%)	(82.1)	(13.3)	(3.1)	(0.5)	(0.4)	(0.6)	(100.0)					
90歳～	52	8	4				64		56	120	0.25	0.56
(%)	(81.3)	(12.5)	(6.3)				(100.0)					
合計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
不明												
(%)												
記載なし												
(%)												
総計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
平均	63.63	65.67	66.10	65.80	63.50	61.14	63.91		64.01	63.95		
標準偏差	15.02	15.03	12.72	13.28	19.24	19.02	15.00		14.95	14.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5919##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査