

表 1505 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

PD歴	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	1,020	67	39	9	8	14	1,157		112	1,269	0.33	1.27
(%)	(88.2)	(5.8)	(3.4)	(0.8)	(0.7)	(1.2)	(100.0)					
1年 ~	861	131	28	4	2	3	1,029		86	1,115	0.24	0.86
(%)	(83.7)	(12.7)	(2.7)	(0.4)	(0.2)	(0.3)	(100.0)					
2年 ~	1,003	149	31	5	2	2	1,192		78	1,270	0.21	0.58
(%)	(84.1)	(12.5)	(2.6)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(100.0)					
4年 ~	474	53	16	3		1	547		44	591	0.18	0.53
(%)	(86.7)	(9.7)	(2.9)	(0.5)		(0.2)	(100.0)					
6年 ~	191	26	1	2			220		18	238	0.15	0.44
(%)	(86.8)	(11.8)	(0.5)	(0.9)			(100.0)					
8年 ~	60	10	2		1		73		16	89	0.25	0.64
(%)	(82.2)	(13.7)	(2.7)		(1.4)		(100.0)					
10年 ~	82	10	2	1			95		7	102	0.18	0.50
(%)	(86.3)	(10.5)	(2.1)	(1.1)			(100.0)					
合計	3,691	446	119	24	13	20	4,313		361	4,674	0.24	0.87
(%)	(85.6)	(10.3)	(2.8)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
記載なし	74	14	2	1	1	1	93		2,164	2,257	0.34	0.90
(%)	(79.6)	(15.1)	(2.2)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(100.0)					
総計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					
平均	2.63	2.91	2.40	2.68	1.41	0.84	2.64		2.63	2.64		
標準偏差	2.62	2.43	2.89	2.69	2.17	1.30	2.61		2.76	2.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5920##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査