

表 1509 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独	3,528	545	185	71	28	34	4,391		2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
PD.HD併用週1HD(F)	714	90	38	17	2	6	867		629	1,496	0.30	0.81
(%)	(82.4)	(10.4)	(4.4)	(2.0)	(0.2)	(0.7)	(100.0)					
PD.HD併用週2HD(F)	33	3		4	1	1	42		78	120	0.57	1.27
(%)	(78.6)	(7.1)		(9.5)	(2.4)	(2.4)	(100.0)					
PD.HD併用週3HD(F)												
(%)												
PD.HD併用週4HD(F)												
(%)												
PD.HD併用その他	32	1					33		16	49	0.03	0.17
(%)	(97.0)	(3.0)					(100.0)					
合計	4,307	639	223	92	31	41	5,333		3,263	8,596	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
不明	1						1		3	4		
(%)	(100.0)						(100.0)					
記載なし									15	15		
(%)												
総計	4,308	639	223	92	31	41	5,334		3,281	8,615	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D6011##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査