

表 1511 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満	48	6	4	1			59		26	85	0.31	0.71
(%)	(81.4)	(10.2)	(6.8)	(1.7)			(100.0)					
15歳～	46	6	4	2			58		36	94	0.35	0.77
(%)	(79.3)	(10.3)	(6.9)	(3.4)			(100.0)					
30歳～	290	47	23	12		5	377		231	608	0.44	0.99
(%)	(76.9)	(12.5)	(6.1)	(3.2)		(1.3)	(100.0)					
45歳～	1,117	167	53	14	8	11	1,370		913	2,283	0.32	0.92
(%)	(81.5)	(12.2)	(3.9)	(1.0)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
60歳～	1,880	276	94	42	14	19	2,325		1,393	3,718	0.35	1.05
(%)	(80.9)	(11.9)	(4.0)	(1.8)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
75歳～	870	131	41	21	8	5	1,076		625	1,701	0.35	1.16
(%)	(80.9)	(12.2)	(3.8)	(2.0)	(0.7)	(0.5)	(100.0)					
90歳～	57	6	4		1	1	69		57	126	0.35	0.93
(%)	(82.6)	(8.7)	(5.8)		(1.4)	(1.4)	(100.0)					
合計	4,308	639	223	92	31	41	5,334		3,281	8,615	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
不明												
(%)												
記載なし												
(%)												
総計	4,308	639	223	92	31	41	5,334		3,281	8,615	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
平均	63.30	63.14	61.61	63.00	67.52	62.90	63.23		63.04	63.16		
標準偏差	14.54	14.42	16.08	15.59	11.49	12.99	14.58		14.32	14.48		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
 個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。
 ##D6013##
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2016年調査