

表 1517 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
15歳未満	48	6	4	1			59		26	85	0.31	0.71	
(%)	(81.4)	(10.2)	(6.8)	(1.7)			(100.0)						
15歳 ~	41	5	3	2			51		28	79	0.34	0.77	
(%)	(80.4)	(9.8)	(5.9)	(3.9)			(100.0)						
30歳 ~	215	41	20	6			2	284		175	459	0.41	0.86
(%)	(75.7)	(14.4)	(7.0)	(2.1)			(0.7)	(100.0)					
45歳 ~	838	132	38	8	7	9	1,032			618	1,650	0.33	0.96
(%)	(81.2)	(12.8)	(3.7)	(0.8)	(0.7)	(0.9)	(100.0)						
60歳 ~	1,545	234	81	35	13	18	1,926			1,070	2,996	0.37	1.11
(%)	(80.2)	(12.1)	(4.2)	(1.8)	(0.7)	(0.9)	(100.0)						
75歳 ~	788	121	35	19	8	4	975			567	1,542	0.35	1.19
(%)	(80.8)	(12.4)	(3.6)	(1.9)	(0.8)	(0.4)	(100.0)						
90歳 ~	53	6	4				1	64		56	120	0.32	0.84
(%)	(82.8)	(9.4)	(6.3)				(1.6)	(100.0)					
合計	3,528	545	185	71	28	34	4,391			2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)						
不明													
(%)													
記載なし													
(%)													
総計	3,528	545	185	71	28	34	4,391			2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)						
平均	63.99	63.64	62.09	64.85	67.21	64.38	63.90			64.02	63.95		
標準偏差	15.00	14.76	16.67	15.74	10.76	12.28	15.02			14.92	14.98		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

#D6019##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査