

表 1521 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	0.5未満	0.5 ~	0.65 ~	0.81 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	210 (11.3)	683 (36.7)	734 (39.5)	232 (12.5)	1,859 (100.0)	3,114	4,973	0.65	0.14
腹膜透析 (APD) (%)	97 (9.1)	360 (33.8)	448 (42.0)	161 (15.1)	1,066 (100.0)	1,571	2,637	0.67	0.14
腹膜透析 (CCPD) (%)	49 (12.3)	130 (32.6)	166 (41.6)	54 (13.5)	399 (100.0)	606	1,005	0.65	0.15
合計 (%)	356 (10.7)	1,173 (35.3)	1,348 (40.6)	447 (13.4)	3,324 (100.0)	5,291	8,615	0.66	0.14
記載なし (%)									
総計 (%)	356 (10.7)	1,173 (35.3)	1,348 (40.6)	447 (13.4)	3,324 (100.0)	5,291	8,615	0.66	0.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6110##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査