

表 1522 PET Cr D/P比 併用の状況別 (腹膜透析患者)

| 併用の状況 | 0.5未満 | 0.5 ~ | 0.65 ~ | 0.81 ~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------|-------|------|------|
| PD単独 (%) | 252 (9.5) | 923 (34.8) | 1,092 (41.2) | 383 (14.5) | 2,650 (100.0) | 4,281 | 6,931 | 0.66 | 0.14 |
| PD.HD併用週1HD(F) (%) | 79 (13.1) | 224 (37.3) | 239 (39.8) | 59 (9.8) | 601 (100.0) | 895 | 1,496 | 0.64 | 0.15 |
| PD.HD併用週2HD(F) (%) | 23 (38.3) | 24 (40.0) | 9 (15.0) | 4 (6.7) | 60 (100.0) | 60 | 120 | 0.55 | 0.13 |
| PD.HD併用週3HD(F) (%) | | | | | | | | | |
| PD.HD併用週4HD(F) (%) | | | | | | | | | |
| PD.HD併用その他 (%) | 2 (15.4) | 2 (15.4) | 8 (61.5) | 1 (7.7) | 13 (100.0) | 36 | 49 | 0.68 | 0.12 |
| 合計 (%) | 356 (10.7) | 1,173 (35.3) | 1,348 (40.6) | 447 (13.4) | 3,324 (100.0) | 5,272 | 8,596 | 0.66 | 0.14 |
| 不明 (%) | | | | | | 4 | 4 | | |
| 記載なし (%) | | | | | | 15 | 15 | | |
| 総計 (%) | 356 (10.7) | 1,173 (35.3) | 1,348 (40.6) | 447 (13.4) | 3,324 (100.0) | 5,291 | 8,615 | 0.66 | 0.14 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6111##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査