

表 1529 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

| 治療方法 (新分類) | 0.5未満 | 0.5 ~ | 0.65 ~ | 0.81 ~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 腹膜透析 (CAPD) (%) | 140 (9.3) | 540 (35.7) | 624 (41.3) | 208 (13.8) | 1,512 (100.0) | 2,624 | 4,136 | 0.66 | 0.14 |
| 腹膜透析 (APD) (%) | 79 (9.2) | 294 (34.3) | 348 (40.6) | 136 (15.9) | 857 (100.0) | 1,261 | 2,118 | 0.67 | 0.14 |
| 腹膜透析 (CCPD) (%) | 33 (11.7) | 89 (31.7) | 120 (42.7) | 39 (13.9) | 281 (100.0) | 396 | 677 | 0.66 | 0.15 |
| 合計 (%) | 252 (9.5) | 923 (34.8) | 1,092 (41.2) | 383 (14.5) | 2,650 (100.0) | 4,281 | 6,931 | 0.66 | 0.14 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 252 (9.5) | 923 (34.8) | 1,092 (41.2) | 383 (14.5) | 2,650 (100.0) | 4,281 | 6,931 | 0.66 | 0.14 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6120##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査