

表 1536 PET Cr D/P比 使用透析液の種類別（腹膜透析単独患者）

使用透析液の種類	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ(イコデキストリンなし) (%)	162 (15.1)	453 (42.2)	356 (33.1)	103 (9.6)	1,074 (100.0)	943	2,017	0.62	0.14
1.5%液と2.5%液の併用(イコデキストリンなし) (%)	21 (8.4)	100 (40.2)	98 (39.4)	30 (12.0)	249 (100.0)	223	472	0.65	0.13
2.5%液のみ(イコデキストリンなし) (%)	4 (7.0)	17 (29.8)	25 (43.9)	11 (19.3)	57 (100.0)	61	118	0.67	0.15
4.25%液のみ(イコデキストリンなし) (%)		1 (100.0)			1 (100.0)	4	5	0.62	
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし) (%)	4 (15.4)	4 (15.4)	13 (50.0)	5 (19.2)	26 (100.0)	31	57	0.68	0.15
1.5%液+イコデキストリン (%)	36 (4.8)	201 (26.9)	363 (48.7)	146 (19.6)	746 (100.0)	532	1,278	0.70	0.13
1.5%液+2.5%液+イコデキストリン (%)	14 (4.9)	92 (32.5)	130 (45.9)	47 (16.6)	283 (100.0)	174	457	0.69	0.13
2.5%液+イコデキストリン (%)	8 (4.3)	44 (23.4)	97 (51.6)	39 (20.7)	188 (100.0)	177	365	0.71	0.13
4.25%液+イコデキストリン (%)	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)		6 (100.0)	1	7	0.60	0.11
合計 (%)	250 (9.5)	916 (34.8)	1,083 (41.2)	381 (14.5)	2,630 (100.0)	2,146	4,776	0.66	0.14
不明 (%)		1 (12.5)	6 (75.0)	1 (12.5)	8 (100.0)	5	13	0.69	0.10
記載なし (%)	2 (16.7)	6 (50.0)	3 (25.0)	1 (8.3)	12 (100.0)			0.61	0.12
総計 (%)	252 (9.5)	923 (34.8)	1,092 (41.2)	383 (14.5)	2,650 (100.0)	4,281	6,931	0.66	0.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D6127##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査