

表 1542 残腎Kt/V 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	68	155	310	239	156	32	20	18	998	2,620	3,618	0.81	0.64
(%)	(6.8)	(15.5)	(31.1)	(23.9)	(15.6)	(3.2)	(2.0)	(1.8)	(100.0)				
2年～	216	301	241	124	64	13	13	5	977	2,007	2,984	0.46	0.50
(%)	(22.1)	(30.8)	(24.7)	(12.7)	(6.6)	(1.3)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
5年～	197	109	54	26	21	2	3	1	413	1,162	1,575	0.28	0.44
(%)	(47.7)	(26.4)	(13.1)	(6.3)	(5.1)	(0.5)	(0.7)	(0.2)	(100.0)				
10年～	48	9	2		1				60	229	289	0.07	0.23
(%)	(80.0)	(15.0)	(3.3)		(1.7)				(100.0)				
15年～	15	2	1					1	19	66	85	0.17	0.57
(%)	(78.9)	(10.5)	(5.3)					(5.3)	(100.0)				
20年～	2								2	26	28		
(%)	(100.0)								(100.0)				
25年～	2								2	7	9		
(%)	(100.0)								(100.0)				
30年～	1								1	5	6		
(%)	(100.0)								(100.0)				
35年～	1								1		1		
(%)	(100.0)								(100.0)				
40年～										2	2		
(%)													
合計	550	576	608	389	242	47	36	25	2,473	6,124	8,597	0.56	0.59
(%)	(22.2)	(23.3)	(24.6)	(15.7)	(9.8)	(1.9)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
不明	1					1			2	16	18	0.85	1.20
(%)	(50.0)					(50.0)			(100.0)				
記載なし													
(%)													
総計	551	576	608	389	242	48	36	25	2,475	6,140	8,615	0.56	0.59
(%)	(22.3)	(23.3)	(24.6)	(15.7)	(9.8)	(1.9)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
平均	5.32	3.01	1.95	1.57	1.57	1.43	1.81	1.84	2.84	3.10	3.03		
標準偏差	4.30	2.27	1.93	1.72	1.88	1.51	1.89	3.42	3.05	3.69	3.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6215##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査