

表 1545 残腎Kt/V 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1 ~	0.4 ~	0.8 ~	1.2 ~	1.7 ~	2.0 ~	2.4 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	155 (13.4)	259 (22.3)	332 (28.6)	219 (18.9)	128 (11.0)	30 (2.6)	23 (2.0)	15 (1.3)	1,161 (100.0)	2,975	4,136	0.67	0.63
腹膜透析 (APD) (%)	95 (14.3)	156 (23.5)	174 (26.2)	135 (20.3)	75 (11.3)	12 (1.8)	10 (1.5)	8 (1.2)	665 (100.0)	1,453	2,118	0.63	0.55
腹膜透析 (CCPD) (%)	57 (23.4)	59 (24.2)	68 (27.9)	28 (11.5)	26 (10.7)	3 (1.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	244 (100.0)	433	677	0.50	0.50
合計 (%)	307 (14.8)	474 (22.9)	574 (27.7)	382 (18.5)	229 (11.1)	45 (2.2)	35 (1.7)	24 (1.2)	2,070 (100.0)	4,861	6,931	0.64	0.60
記載なし (%)													
総計 (%)	307 (14.8)	474 (22.9)	574 (27.7)	382 (18.5)	229 (11.1)	45 (2.2)	35 (1.7)	24 (1.2)	2,070 (100.0)	4,861	6,931	0.64	0.60

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6220##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査