

表 1552 PD Kt/V 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1 ~	0.4 ~	0.8 ~	1.2 ~	1.7 ~	2.0 ~	2.4 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)		117 (7.8)	195 (13.0)	332 (22.2)	550 (36.8)	192 (12.8)	80 (5.3)	30 (2.0)	1,496 (100.0)	3,477	4,973	1.22	0.55
腹膜透析 (APD) (%)		77 (8.6)	96 (10.8)	241 (27.0)	303 (34.0)	101 (11.3)	47 (5.3)	26 (2.9)	891 (100.0)	1,746	2,637	1.20	0.56
腹膜透析 (CCPD) (%)		15 (4.3)	26 (7.4)	73 (20.8)	154 (43.9)	47 (13.4)	26 (7.4)	10 (2.8)	351 (100.0)	654	1,005	1.33	0.52
合計 (%)		209 (7.6)	317 (11.6)	646 (23.6)	1,007 (36.8)	340 (12.4)	153 (5.6)	66 (2.4)	2,738 (100.0)	5,877	8,615	1.23	0.55
記載なし (%)													
総計 (%)		209 (7.6)	317 (11.6)	646 (23.6)	1,007 (36.8)	340 (12.4)	153 (5.6)	66 (2.4)	2,738 (100.0)	5,877	8,615	1.23	0.55

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6310##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査