

表 1553 PD Kt/V 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	0.1未満	0.1 ~	0.4 ~	0.8 ~	1.2 ~	1.7 ~	2.0 ~	2.4 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	152 (6.8)	266 (11.9)	560 (25.0)	803 (35.9)	275 (12.3)	124 (5.5)	58 (2.6)	2,238 (100.0)	4,693	6,931	1.23	0.55	
PD.HD併用週1HD(F) (%)	38 (8.7)	30 (6.8)	79 (18.0)	193 (44.1)	63 (14.4)	27 (6.2)	8 (1.8)	438 (100.0)	1,058	1,496	1.28	0.54	
PD.HD併用週2HD(F) (%)	17 (32.1)	21 (39.6)	6 (11.3)	7 (13.2)	1 (1.9)	1 (1.9)	1 (1.9)	53 (100.0)	67	120	0.63	0.46	
PD.HD併用週3HD(F) (%)													
PD.HD併用週4HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)	2 (22.2)		1 (11.1)	4 (44.4)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)	40	49	1.23	0.65	
合計 (%)	209 (7.6)	317 (11.6)	646 (23.6)	1,007 (36.8)	340 (12.4)	153 (5.6)	66 (2.4)	2,738 (100.0)	5,858	8,596	1.23	0.55	
不明 (%)									4	4			
記載なし (%)									15	15			
総計 (%)	209 (7.6)	317 (11.6)	646 (23.6)	1,007 (36.8)	340 (12.4)	153 (5.6)	66 (2.4)	2,738 (100.0)	5,877	8,615	1.23	0.55	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6311##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査