

表 1560 PD Kt/V 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1 ~	0.4 ~	0.8 ~	1.2 ~	1.7 ~	2.0 ~	2.4 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)		84 (6.7)	157 (12.5)	309 (24.6)	444 (35.4)	166 (13.2)	68 (5.4)	27 (2.2)	1,255 (100.0)	2,881	4,136	1.23	0.54
腹膜透析 (APD) (%)		58 (7.9)	91 (12.4)	200 (27.2)	243 (33.0)	83 (11.3)	37 (5.0)	24 (3.3)	736 (100.0)	1,382	2,118	1.20	0.56
腹膜透析 (CCPD) (%)		10 (4.0)	18 (7.3)	51 (20.6)	116 (47.0)	26 (10.5)	19 (7.7)	7 (2.8)	247 (100.0)	430	677	1.33	0.51
合計 (%)		152 (6.8)	266 (11.9)	560 (25.0)	803 (35.9)	275 (12.3)	124 (5.5)	58 (2.6)	2,238 (100.0)	4,693	6,931	1.23	0.55
記載なし (%)													
総計 (%)		152 (6.8)	266 (11.9)	560 (25.0)	803 (35.9)	275 (12.3)	124 (5.5)	58 (2.6)	2,238 (100.0)	4,693	6,931	1.23	0.55

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6320##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査