

表 1567 総透析量 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1 ~	0.4 ~	0.8 ~	1.2 ~	1.7 ~	2.0 ~	2.4 ~	2.8 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)		18 (1.6)	16 (1.4)	64 (5.7)	280 (24.8)	328 (29.1)	268 (23.8)	93 (8.2)	61 (5.4)	1,128 (100.0)	3,008	4,136	1.84	0.58
腹膜透析 (APD) (%)		30 (4.6)	16 (2.4)	34 (5.2)	190 (29.1)	158 (24.2)	142 (21.7)	44 (6.7)	40 (6.1)	654 (100.0)	1,464	2,118	1.77	0.67
腹膜透析 (CCPD) (%)		4 (1.7)	2 (0.8)	7 (2.9)	78 (32.5)	70 (29.2)	50 (20.8)	19 (7.9)	10 (4.2)	240 (100.0)	437	677	1.80	0.52
合計 (%)		52 (2.6)	34 (1.7)	105 (5.2)	548 (27.1)	556 (27.5)	460 (22.7)	156 (7.7)	111 (5.5)	2,022 (100.0)	4,909	6,931	1.81	0.60
記載なし (%)														
総計 (%)		52 (2.6)	34 (1.7)	105 (5.2)	548 (27.1)	556 (27.5)	460 (22.7)	156 (7.7)	111 (5.5)	2,022 (100.0)	4,909	6,931	1.81	0.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6410##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査