

表 1571 総透析量 透析歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		18 (2.0)	9 (1.0)	44 (4.8)	238 (26.2)	234 (25.7)	226 (24.9)	77 (8.5)	63 (6.9)	909 (100.0)	2,497	3,406	1.88	0.62
2年～ (%)		27 (3.4)	19 (2.4)	45 (5.6)	225 (28.2)	217 (27.2)	176 (22.0)	54 (6.8)	36 (4.5)	799 (100.0)	1,585	2,384	1.75	0.59
5年～ (%)		6 (2.2)	5 (1.8)	15 (5.5)	77 (28.3)	88 (32.4)	51 (18.8)	18 (6.6)	12 (4.4)	272 (100.0)	668	940	1.77	0.57
10年～ (%)		1 (3.6)	1 (3.6)	1 (3.6)	4 (14.3)	12 (42.9)	7 (25.0)	2 (7.1)		28 (100.0)	99	127	1.71	0.52
15年～ (%)					3 (33.3)	2 (22.2)		4 (44.4)		9 (100.0)	31	40	2.01	0.43
20年～ (%)						1 (100.0)				1 (100.0)	15	16	1.90	
25年～ (%)					1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	2	4	1.75	0.21
30年～ (%)											2	2		
35年～ (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	1.70	
40年～ (%)														
合計 (%)		52 (2.6)	34 (1.7)	105 (5.2)	548 (27.1)	556 (27.5)	460 (22.8)	155 (7.7)	111 (5.5)	2,021 (100.0)	4,899	6,920	1.81	0.60
不明 (%)								1 (100.0)		1 (100.0)	10	11	2.40	
記載なし (%)														
総計 (%)		52 (2.6)	34 (1.7)	105 (5.2)	548 (27.1)	556 (27.5)	460 (22.7)	156 (7.7)	111 (5.5)	2,022 (100.0)	4,909	6,931	1.81	0.60
平均		2.33	2.97	2.52	2.39	2.72	2.18	2.59	1.94	2.44	2.40	2.41		
標準偏差		2.00	2.28	2.35	2.50	3.16	2.32	3.16	2.05	2.68	3.04	2.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6414##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査