

表 1573 総透析量 医療機関別（腹膜透析単独患者）

| 医療機関 | 0.1未満 | 0.1～ | 0.4～ | 0.8～ | 1.2～ | 1.7～ | 2.0～ | 2.4～ | 2.8～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|---------------------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 国公立大学 (%) | | | | 1 (0.6) | 51 (30.0) | 49 (28.8) | 43 (25.3) | 18 (10.6) | 8 (4.7) | 170 (100.0) | 319 | 489 | 1.91 | 0.46 |
| 私立大学 (%) | | 1 (0.3) | 3 (0.9) | 13 (3.9) | 92 (27.6) | 98 (29.4) | 75 (22.5) | 32 (9.6) | 19 (5.7) | 333 (100.0) | 623 | 956 | 1.88 | 0.53 |
| 国立病院機構等 (%) | | | | 2 (4.9) | 11 (26.8) | 10 (24.4) | 6 (14.6) | 7 (17.1) | 5 (12.2) | 41 (100.0) | 170 | 211 | 2.00 | 0.63 |
| 県市町村立・国保 (%) | | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 23 (5.6) | 103 (25.0) | 120 (29.1) | 103 (25.0) | 35 (8.5) | 26 (6.3) | 412 (100.0) | 909 | 1,321 | 1.90 | 0.56 |
| JCHO(旧社会保険)等 (%) | | | | 7 (11.3) | 19 (30.6) | 17 (27.4) | 13 (21.0) | 4 (6.5) | 2 (3.2) | 62 (100.0) | 390 | 452 | 1.74 | 0.46 |
| 厚生連等 (%) | | 2 (1.5) | 8 (6.0) | 4 (3.0) | 23 (17.2) | 51 (38.1) | 31 (23.1) | 8 (6.0) | 7 (5.2) | 134 (100.0) | 320 | 454 | 1.82 | 0.58 |
| その他公的 (%) | | 2 (0.8) | 7 (2.6) | 14 (5.3) | 90 (34.0) | 55 (20.8) | 64 (24.2) | 22 (8.3) | 11 (4.2) | 265 (100.0) | 829 | 1,094 | 1.78 | 0.54 |
| 私立総合 (%) | | 1 (1.6) | 1 (1.6) | 11 (17.2) | 22 (34.4) | 9 (14.1) | 11 (17.2) | 2 (3.1) | 7 (10.9) | 64 (100.0) | 213 | 277 | 1.71 | 0.73 |
| 私立 (%) | | 42 (9.7) | 11 (2.5) | 28 (6.5) | 116 (26.8) | 111 (25.6) | 85 (19.6) | 19 (4.4) | 21 (4.8) | 433 (100.0) | 843 | 1,276 | 1.64 | 0.73 |
| 私立診療所 (%) | | 3 (2.8) | 3 (2.8) | 2 (1.9) | 21 (19.4) | 36 (33.3) | 29 (26.9) | 9 (8.3) | 5 (4.6) | 108 (100.0) | 293 | 401 | 1.87 | 0.60 |
| 総計 (%) | | 52 (2.6) | 34 (1.7) | 105 (5.2) | 548 (27.1) | 556 (27.5) | 460 (22.7) | 156 (7.7) | 111 (5.5) | 2,022 (100.0) | 4,909 | 6,931 | 1.81 | 0.60 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6416##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査