

表 1574 腹膜炎罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,662 (84.1)	401 (12.7)	81 (2.6)	15 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)		3,165 (100.0)	3	1,805	4,973
腹膜透析 (APD) (%)	1,518 (87.5)	177 (10.2)	27 (1.6)	11 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (100.0)	1,735 (100.0)		902	2,637
腹膜透析 (CCPD) (%)	573 (88.0)	67 (10.3)	9 (1.4)	1 (0.2)					1 (0.2)	651 (100.0)			354	1,005
合計 (%)	4,753 (85.6)	645 (11.6)	117 (2.1)	27 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,551 (100.0)	3	3,061	8,615
記載なし (%)														
総計 (%)	4,753 (85.6)	645 (11.6)	117 (2.1)	27 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,551 (100.0)	3	3,061	8,615

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6510##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査