

表 1575 腹膜炎罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
PD単独 (%)	3,865 (85.4)	530 (11.7)	99 (2.2)	23 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)		4,525 (100.0)		2,406	6,931
PD.HD併用週1HD(F) (%)	794 (87.3)	95 (10.5)	15 (1.7)	4 (0.4)						1 (0.1)	909 (100.0)	3	584	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	65 (78.3)	16 (19.3)	2 (2.4)								83 (100.0)		37	120
PD.HD併用週3HD(F) (%)														
PD.HD併用週4HD(F) (%)														
PD.HD併用その他 (%)	28 (84.8)	4 (12.1)	1 (3.0)								33 (100.0)		16	49
合計 (%)	4,752 (85.6)	645 (11.6)	117 (2.1)	27 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,550 (100.0)	3	3,043	8,596
不明 (%)	1 (100.0)										1 (100.0)		3	4
記載なし (%)													15	15
総計 (%)	4,753 (85.6)	645 (11.6)	117 (2.1)	27 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,551 (100.0)	3	3,061	8,615

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D6511#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査