

表 1586 腹膜炎罹患回数(回/年) 原疾患別 (腹膜透析単独患者)

原疾患	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	1,170 (86.7)	140 (10.4)	26 (1.9)	12 (0.9)	1 (0.1)						1,349 (100.0)		661	2,010
慢性腎盂腎炎 (%)	48 (82.8)	7 (12.1)	3 (5.2)								58 (100.0)		23	81
急速進行性糸球体腎炎 (%)	31 (88.6)	2 (5.7)	2 (5.7)								35 (100.0)		18	53
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)									14 (100.0)		3	17
その他の分類不能の腎炎 (%)	34 (91.9)	1 (2.7)	1 (2.7)	1 (2.7)							37 (100.0)		17	54
多発性嚢胞腎 (%)	127 (83.6)	23 (15.1)	2 (1.3)								152 (100.0)		76	228
腎硬化症 (%)	541 (85.6)	73 (11.6)	14 (2.2)	3 (0.5)	1 (0.2)						632 (100.0)		311	943
悪性高血圧 (%)	50 (89.3)	2 (3.6)	3 (5.4)	1 (1.8)							56 (100.0)		31	87
糖尿病性腎症 (%)	1,206 (84.1)	186 (13.0)	33 (2.3)	5 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		1 (0.1)		1,434 (100.0)		813	2,247
SLE腎炎 (%)	22 (84.6)	3 (11.5)	1 (3.8)								26 (100.0)		20	46
アミロイド腎 (%)	10 (100.0)										10 (100.0)		4	14
痛風腎 (%)	10 (90.9)		1 (9.1)								11 (100.0)		4	15
先天性代謝異常による腎不全 (%)	10 (83.3)	2 (16.7)									12 (100.0)		3	15
腎・尿路結核 (%)													1	1
腎・尿路結石 (%)	9 (81.8)	2 (18.2)									11 (100.0)		6	17
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)								7 (100.0)		2	9
閉塞性尿路障害 (%)	11 (91.7)	1 (8.3)									12 (100.0)		5	17
骨髄腫 (%)	5 (83.3)	1 (16.7)									6 (100.0)		1	7
腎形成不全 (%)	32 (88.9)	4 (11.1)									36 (100.0)		22	58
不明 (%)	389 (85.1)	57 (12.5)	9 (2.0)	1 (0.2)	1 (0.2)						457 (100.0)		279	736
再導入 (%)	22 (75.9)	6 (20.7)	1 (3.4)								29 (100.0)		21	50
その他 (%)	121 (85.8)	17 (12.1)	2 (1.4)			1 (0.7)					141 (100.0)		85	226
合計 (%)	3,865 (85.4)	530 (11.7)	99 (2.2)	23 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)		4,525 (100.0)		2,406	6,931
記載なし (%)														
総計 (%)	3,865 (85.4)	530 (11.7)	99 (2.2)	23 (0.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)		4,525 (100.0)		2,406	6,931

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6524##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査