

表 1589 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,565 (80.9)	423 (13.3)	113 (3.6)	47 (1.5)	15 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)		1 (0.0)	3,170 (100.0)	2	1,801	4,973
腹膜透析 (APD) (%)	1,371 (80.1)	233 (13.6)	70 (4.1)	25 (1.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	6 (0.4)	1 (0.1)		1,711 (100.0)	1	925	2,637	
腹膜透析 (CCPD) (%)	508 (78.5)	95 (14.7)	29 (4.5)	12 (1.9)	3 (0.5)					647 (100.0)		358	1,005	
合計 (%)	4,444 (80.4)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	5,528 (100.0)	3	3,084	8,615	
記載なし (%)														
総計 (%)	4,444 (80.4)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	5,528 (100.0)	3	3,084	8,615	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6610##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査