

表 1590 出口部感染罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
PD単独	3,618 (%)	637 (14.1)	168 (3.7)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	4,508	1 (100.0)	1 (100.0)	2,422 6,931
PD.HD併用週1HD(F)	735 (%)	101 (11.2)	41 (4.5)	18 (2.0)	3 (0.3)	1 (0.1)	4 (0.4)	1 (0.1)			904	2 (100.0)	590 (100.0)	1,496 120
PD.HD併用週2HD(F)	58 (%)	12 (14.6)	3 (3.7)	7 (8.5)	1 (1.2)	1 (1.2)					82 (100.0)		38 (100.0)	
PD.HD併用週3HD(F)														
PD.HD併用週4HD(F)														
PD.HD併用その他	32 (%)	1 (3.0)									33 (100.0)		16 (100.0)	49
合計	4,443 (%)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)		1 (0.0)	5,527 (100.0)	3 (100.0)	3,066 (100.0)	8,596 4
不明	1 (100.0)										1 (100.0)		3 (100.0)	4
記載なし													15 (100.0)	15
総計	4,444 (%)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)		1 (0.0)	5,528 (100.0)	3 (100.0)	3,084 (100.0)	8,615 4

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D6611#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査