

表 1597 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,141 (80.8)	361 (13.6)	95 (3.6)	35 (1.3)	12 (0.5)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	2,649 (100.0)		1,487	4,136
腹膜透析 (APD) (%)	1,125 (79.8)	205 (14.5)	58 (4.1)	16 (1.1)	3 (0.2)		2 (0.1)	1 (0.1)			1,410 (100.0)	1	707	2,118
腹膜透析 (CCPD) (%)	352 (78.4)	71 (15.8)	15 (3.3)	8 (1.8)	3 (0.7)						449 (100.0)		228	677
合計 (%)	3,618 (80.3)	637 (14.1)	168 (3.7)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	4,508 (100.0)	1	2,422	6,931
記載なし (%)														
総計 (%)	3,618 (80.3)	637 (14.1)	168 (3.7)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	4,508 (100.0)	1	2,422	6,931

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D6620##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査